# VOTRIENT® pazopanib

## PRESCRIPTION ET DELIVRANCE

Ce médicament est prescrit et renouvelé par votre **médecin hospitalier spécialiste en cancérologie, en hématologie ou en oncologie médicale**.
Il est disponible uniquement dans les **pharmacies de ville**

Lorsque vous quittez votre domicile, pensez à prendre vos ordonnances. Pour un meilleur suivi, faites activer votre dossier pharmaceutique auprès de votre pharmacien.

**Ne jetez pas les boîtes entamées ni les comprimés restants dans votre poubelle**. Merci de les rapporter à votre pharmacien.
**Votre pharmacien peut vous aider dans la prise de votre traitement**, veuillez lui rapporter vos boîtes et comprimés non utilisés lors du renouvellement suivant.

## PRESENTATIONS ET CONSERVATION

**Comprimé 200 mg** pelliculé, rose, en forme de gélule (657,23 € HT boite de 30)

**Comprimé 400 mg** pelliculé, blanc, en forme de gélule (1 314,45 € HT boite de 30 et 2 628,90 € HT boite de 60)

Conservez ce médicament à une **température inférieure à 25°C**.
**Gardez-le hors de la vue et de la portée des enfants.**

## MODE D'EMPLOI

La dose est strictement personnelle et peut être modifiée au cours du traitement par votre médecin spécialiste. La dose habituelle est de : **800 mg une fois par jour**
Les doses peuvent être ajustées en fonction de la tolérance par paliers de 200 mg
**Le bon suivi du mode d'emploi est nécessaire à l'efficacité de votre traitement.**

Les comprimés de VOTRIENT® sont à avaler entiers sans nourriture avec un ***verre d'eau en une prise par jour*** *une heure avant, ou deux heures après un repas* ***et chaque jour à la même heure****.*

Les comprimés ne doivent ni être écrasés, ni coupés ou croqués.

Le ***pamplemousse*** (jus, pulpe) doit être évité pendant votre traitement par VOTRIENT®.

## INTERACTIONS MEDICAMENTEUSES

Ce médicament peut interagir avec d'autres médicaments, plantes ou tisanes. Par exemple, il faut éviter la prise du **millepertuis** (*Hypericum perforatum*) sous toutes ses formes (gélule, résine, tisane, gouttes…)

**N'hésitez pas à préciser à votre médecin, les médicaments, plantes ou tisanes (avec ou sans ordonnance) que vous prenez ou que vous souhaitez prendre.**
En cas de doute, demandez conseil à votre pharmacien.

Evitez les médicaments utilisés pour traiter les brûlures d'estomac (anti-acides et anti-sécrétoires). En cas de besoin demandez conseil à votre pharmacien pour déterminer les heures de prises respectives de VOTRIENT® et du médicament prescrit contre les brûlures d'estomac.

**Ne soyez pas inquiet à la lecture de ces effets, il est possible que vous n'en éprouviez aucun.**

| EFFETS INDESIRABLES | PREVENTION | CONDUITE A TENIR |
|---|---|---|
| **Maux tête, palpitations, sensations de vertiges, bourdonnements d'oreilles** | Surveillance régulière de votre cœur (électrocardiogramme, analyses pour sels minéraux : potassium, calcium, magnésium,…) et de votre tension | Prévenez votre médecin dès l'apparition de ces signes. |

| EFFETS INDESIRABLES | PREVENTION | CONDUITE A TENIR |
|---|---|---|
| **Diarrhée** | Evitez le café, les boissons glacées, le lait, les fruits et légumes crus, les céréales, le pain complet et l'alcool.<br>Surveillance des sels minéraux par analyse. | Suivez la prescription médicale contre la diarrhée. Buvez si possible 2 litres par jour (eau, thé, tisanes, bouillons, boissons gazeuses) et privilégiez les féculents (riz, pâtes…), les carottes cuites et les bananes. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants. |
| **Nausées et vomissements** | Mangez lentement et faites plusieurs petits repas légers. Evitez les aliments gras, frits et épicés. Buvez plutôt entre les repas. | Prenez les médicaments prescrits contre les nausées et vomissements en respectant les doses. Prévenez votre médecin dès les premiers signes persistants (à partir de deux vomissements par jour). |
| **Troubles cutanés Sécheresse dépigmentation** | Préférez un savon doux sans alcool et une crème hydratante. Evitez les expositions au soleil. | Informez votre médecin, des traitements médicaux peuvent vous soulager. |
| **Perte d'appétit** | Prenez plusieurs petites collations par jour (aliments que vous aimez), mangez lentement, buvez beaucoup. | Privilégiez les aliments à fort pouvoir calorique : ajouter du beurre, de l'huile, de la crème fraîche, du fromage râpé, du miel…. Demandez les conseils d'une diététicienne. En cas de perte de poids, parlez-en avec votre médecin. |
| **Fatigue** | Il est normal d'être fatigué au cours du traitement. Veillez à avoir une bonne hygiène de vie (manger et boire sainement).<br>Respectez des temps de repos dans la journée, mais essayez de conserver une activité même modérée. | Soyez à l'écoute de votre corps.<br>Prudence en cas de conduite de véhicules. En cas de fatigue persistante inhabituelle, informez votre médecin.<br>Pratiquez des bilans biologiques de la fonction thyroïdienne. |
| **Inflammation de la bouche** | Evitez les aliments acides, épicés et irritants. Utilisez une brosse à dents souple, un dentifrice doux (sans menthol) et un bain de bouche sans alcool. | En cas d'apparition de douleurs diffuses dans la bouche ou de brûlure : contactez votre médecin. |
| **Signes d'infection : fièvre, frissons, toux, maux de gorge, brûlures urinaires** | Limitez, si possible, les contacts avec les personnes ayant une infection contagieuse. Lavez-vous souvent les mains. Désinfectez soigneusement toute plaie. Faites pratiquer les bilans sanguins prescrits par votre médecin. | En cas de fièvre supérieure à 38°C, prévenez votre médecin qui pourra vous prescrire des antibiotiques. |

Une **modification de la couleur des cheveux** et/ou une **perte de cheveux** et une **altération du goût** peuvent survenir pendant le traitement, n'hésitez pas à en parler avec votre médecin.

Si vous ressentez des **effets non mentionnés**, n'hésitez pas à en parler à votre prescripteur, généraliste ou pharmacien.

## QUELQUES CONSEILS

**Contactez rapidement le médecin** en cas de :

- Modification du rythme cardiaque
- Saignements au niveau du système digestif
- Signes infectieux (fièvres, toux, frissons….)

**N'arrêtez jamais le traitement ou ne modifiez jamais le rythme d'administration sans avis du médecin prescripteur.**

**Si vous avez oublié de prendre vos comprimés de VOTRIENT®**, ne prenez pas la dose manquée. La dose suivante sera prise à l'heure normale, le lendemain. Merci de le noter dans votre carnet de suivi.

Evitez l'**exposition prolongée au soleil et protégez-vous** si vous devez le faire.

**REMARQUES :**

Remerciements : - Groupe VOCC B PL : Observatoire dédié au cancer BPL, réseaux OncoBretagne et ONCO Pays de la Loire, cliniciens, pharmaciens et infirmières d'établissements volontaires B PL, Conseils de l'Ordre B PL, Directions Régionales du Service Médical B PL, OMEDIT B PL, Cancéropôle Grand Ouest, Comité de patients et URPS B PL
- à l'ICO René Gaudducheau Nantes
- à l'OMéDIT de Haute-Normandie et au Réseau Onco-Normand